Prévention des Risques Infectieux au Centre Hospitalier de Douai

Le score agrégé sur 100 correspond à **une classe de performance** allant de A à D, la classe A correspondant aux établissements qui mettent en œuvre la politique la plus avancée de prévention du risque infectieux et de la sécurité des soins.

Classe A **Classe B** **Classe C** **Classe D**

ICALIN.2 : Indice Composite des Activités de Lutte contre les infections Nosocomiales

Il traduit l'implication et le niveau d'engagement de l'établissement dans la prévention du risque infectieux en particulier de sa direction, de son équipe d'hygiène et de son CLIN.

2011	2012	2014	2015	2016
87/100 Classe A	94/100 Classe A	98.5/100 Classe A	97.5/100 Classe A	98/100 Classe A

ICSHA : Indice de Consommation de Solutions Hydro-Alcooliques

2015	2016	2017
ICSHA 2 118.8/100 Classe A	ICSHA 2 V2 94,1/100 Classe A	ICSHA 3 87,7/100 Classe B

Depuis 2005, cet indicateur mesure la consommation d'un des produits phare utilisé pour l'hygiène des mains, mesure clé pour réduire la transmission des germes.
Les objectifs en matière d'hygiène des mains ont augmenté en 2016 puis en 2017.

ICATB.2 : Indicateur Composite de bon Usage Antibiotiques

Il mesure l'implication de l'établissement dans la politique de bon usage des antibiotiques.

2011	2012	2013	2015	2017
93.75/100 Classe A	78.75/100 Classe B	88/100 Classe A	83/100 Classe A	97/100 Classe A

ICA-LISO : Indicateur Composite de Lutte contre les Infections du Site Opératoire

2010	2011	2012	2014	2016
100/100 Classe A	95/100 Classe A	95/100 Classe A	95/100 Classe A	88/100 Classe A

Cet indicateur renseigne, sur l'existence ou non d'une surveillance des infections du site opératoire, et le nombre de services qui réalisent cette surveillance par rapport à l'ensemble des services chirurgicaux.

ICA-BMR : Indicateur Composite de maîtrise de la Diffusion des Bactéries Multi-Résistantes

Cet indicateur présente l'organisation permettant la maitrise de la diffusion des bactéries multi-résistantes, les moyens mobilisés et les actions mise en œuvre.

2011	2012	2013	2015
92/100 Classe B	100/100 Classe A	100/100 Classe A	100/100 Classe A

ISO-ORTHO : Infection du site opératoire 3 mois après la pose d'une prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou

2017
Dans la norme

L'indicateur mesure les infections du site opératoire (ISO), codées dans le programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI) dans les 3 mois suivant la pose d'une prothèse totale de la hanche (PTH) hors fracture ou du genou (PTG) chez l'adulte.

Version du 31/12/2018