

CONSEILS ET PRÉCONISATIONS À DESTINATION DU PATIENT CONCERNANT LE RISQUE D'INFECTIONS GÉNITALES :

De quoi s'agit-il ?	Comment prévenir une infection ?
• Votre traitement peut favoriser l'apparition d'infections majoritairement fongiques appelées mycoses génitales. • Elles sont plus fréquentes chez les femmes et surviennent en début de traitement. • Elles sont en général peu récidivantes et se traitent généralement facilement.	• S'essuyer d'avant en arrière pour les femmes et veiller à une bonne hygiène intime pour les hommes en particulier non circoncis. • Éviter de porter des pantalons trop serrés et privilégier les sous-vêtements en coton. • Changer fréquemment de sous-vêtements et de protections intimes pour éviter la macération.
Quels sont les signes possibles ?	Que faire en cas d'infection ?
• Démangeaisons • Éruptions • Irritations • Rougeurs • Sécrétions inhabituelles • Odeurs inhabituelles Consultez si vous présentez ces symptômes.	• Ne pas arrêter le traitement. • Adopter une toilette intime externe 1 à 2 fois par jour avec un savon au pH neutre. • Appliquer le traitement local (ovule et crème chez la femme, crème chez l'homme) après avoir réalisé une toilette intime et avoir soigneusement séché vos parties intimes. • S'abstenir de rapports sexuels ou utiliser un préservatif.