


INDICATEURS DE PRÉVENTION DES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS


Le Centre Hospitalier de Douai présente ici des indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins (IQSS) coordonnée par la Haute Autorité de Santé.

Consommation de solutions hydro-alcooliques (ICSHA)



La consommation de SHA reflète le niveau d'application de l'hygiène des mains par la technique de friction hydro-alcoolique qui est la méthode à privilégier sur des mains visuellement propres et sèches.


Conformité des durées d'antibiothérapie prescrite pour infection respiratoire basse (ATBIR)




Cet indicateur mesure le taux de séjours ayant une prescription d'antibiotiques inférieure ou égale à 7 jours, ou justifiée pour une durée supérieure, pour une infection respiratoire basse.

Bonnes pratiques de « Précautions Complémentaires Contact » en MCO (PCC)

Cet indicateur mesure le taux de patients porteurs ou infectés par des germes indicateurs pour lesquels :



- des mesures d'hygiène supplémentaires ont effectivement été tracées comme mises en œuvre.



- une trace de l'information transmise au patient (ou à son entourage en cas d'impossibilité) est retrouvée dans son dossier de soins.

Infection de site opératoire en chirurgie orthopédique (ISO-ORTHO)



Cet indicateur mesure les infections du site opératoire 3 mois après la pose d'une prothèse totale de hanche (hors fracture) ou de genou chez l'adulte.

Les professionnels du Centre Hospitalier de Douai sont engagés au quotidien dans une démarche continue de la qualité et de la sécurité des soins de ses usagers. Les axes d'amélioration nécessaires sont, d'ores et déjà, mis en œuvre.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site de la H.A.S. :

